



【腸 FOLFOXIRI療法について】
(フルオロウラシル+レボホリナート+エルプラット+イリノテカン)



様



コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	日																												1日目			
			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
イメドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服	☞	☞	☞	1日目は、抗がん剤の投与開始 60~90分前に飲んでください。										☞	☞	☞	1日目は、抗がん剤の投与開始 60~90分前に飲んでください。										☞					
アロキン注 デキサート柱 ブスコパン柱	吐き気止めです	15分	☞																															
デカドロン錠	吐き気止めです	内服		☞	☞	☞																												
イリノテカン注(165mg/m ²)	抗がん剤です	90分	☞																															
エルプラット注(85mg/m ²)	抗がん剤です	2時間	☞																															
レボホリナート注(200mg/m ²)	5-FUの効果をも高める薬です	2時間	☞																															
フルオロウラシル注(持続)(3200mg/m ²)	抗がん剤です	46時間	☞	↔																														

☺ **治療による副作用** :注意が必要な時期

	日																												1日目	
	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
自覚症状	食欲不振・吐き気	食欲低下や吐き気がする場合があります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																												
	口内炎	口の中が荒れて痛みが出る場合があります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																												
	手足のしびれ	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出る場合があります。冷たいものに触れないようにしましょう。																												
	下痢	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る時はお知らせ下さい。																												
	色素沈着	肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																												
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																												
検査値	白血球減少	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																												
	赤血球減少(貧血)	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																												
	血小板減少	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																												

☺ **注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。**
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
 * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。
本資料は参考としてお使いください。

国家公務員共済組合連合会
大手前病院