



【腸 FTD+Bev療法について】  
(ロンサーフ+アバスチン)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの 時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			ロンサーフ(70mg/m <sup>2</sup> /日)																													
アバスチン注(5mg/kg)	抗がん剤です	30分																														

1日2回服



この週は  
お休みです。



この週は  
お休みです。

😊 **治療による副作用**

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
検査値	食欲不振・吐き気																															
	白血球減少																															
	赤血球減少(貧血)																															
	血小板減少																															

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください **実際の投与スケジュールと異なる場合があります。**

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)

本資料は参考としてお使いください。

国家公務員共済組合連合会  
大手前病院