



【中皮腫 CBDCA+PEM+Bev療法について】  
(アバステン+カルボプラチン+アリムタ)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
パンプタン	葉酸を含む総合ビタミンです	1日1回 内服	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
イメドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服	📄	📄	📄																			📄
グラネセトロン注 デキサート注	吐き気止めです	10分	💉																					💉
アバステン注(15mg/kg)	抗がん剤です	90分	💉																					💉
アリムタ注(500mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	10分	💉																					💉
カルボプラチン注(6・GFR+25)m	抗がん剤です	60分	💉																					💉
デカドロン錠	吐き気止めです	1日1回 内服		📄	📄																			📄

※ アリムタ注による副作用軽減のため、パンプタン(葉酸の粉薬)の内服、メチコパール(ビタミンB12)の注射を行います。

😊 **治療による副作用** : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
自覚症状	過敏症																								
	食欲不振・吐き気																								
	皮疹																								
	口内炎																								
	手足のしびれ																								
	便秘																								
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																								
検査値	白血球減少																								
	赤血球減少(貧血)																								
	血小板減少																								
	肝機能低下																								

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。  
 ●血圧上昇 ●出血(鼻血など) ●タンパク尿 ●胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ●傷の治りが遅い  
 ●血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。  
本資料は参考としてお使いください



\* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。  
 \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。  
 \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使用します。  
 \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

国家公務員共済組合連合会  
大手前病院