



# 【非小細胞肺 Bev+CBDCA+PTX療法について】

## (アバステン+カルボプラチン+パクリタキセル)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用			めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
イメンドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服																												
グラニセトン注 デキサート注 ファモチジン注 ポララミン注	副作用を抑える薬です	30分																												
アバステン注(15mg/kg)	抗がん剤です	90分																												
パクリタキセル注(200mg/m2)	抗がん剤です	3時間																												
カルボプラチン注(6・GFR+25)m	抗がん剤です	1時間																												
デカドロン錠	吐き気止めです	朝 内服																												

2回目から投与時間が短くなる場合があります。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

1回2錠

### 😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	過敏症																							
	食欲不振・吐き気																							
	筋肉痛・関節痛																							
	口内炎																							
	手足のしびれ																							
	便秘																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							
	肝機能低下																							

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使いください

\*注射の針を刺している部分に冷感や浮腫、痛みなどがある場合は、お告げください