



【MM KRd療法(13コース目以降)について】  
(カイプロリス+レブラミド+デキサメタゾン)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール**(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			デキサート注(40mg/body)	ステロイドです	30分																											
カイプロリス注(27mg/m2)	抗がん剤です	10分																														
レブラミドカプセル(25mg/day)	抗がん剤です	1日1回内服																														
デカドロン錠(40mg/body)	ステロイドです	1日1回内服	1回5C																													

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
自覚症状	アレルギー様症状																														
	食欲不振・吐き気																														
	不眠																														
	胃部不快感																														
	便秘																														
	下痢																														
検査値	白血球減少																														
	赤血球減少(貧血)																														
	血小板減少																														

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 心臓・血管への影響(高血圧、胸の圧迫感、足のむくみ)
- 皮膚(皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい。)
- 咳・息切れ・息苦しさ

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

本資料は参考としてお使いください  
国家公務員共済組合連合会  
大手前病院