



【MM DLd療法(3-6コース目)について】


















































(ダラザレックス+レブラミド+デキサメタゾン)



様

コース目

お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
薬の名前	作用	めやすの時間																													
アセトアミノフェン錠 ニボラジン錠 モンテルカスト錠	副作用を抑える薬です	30~90分前に内服	 																												
ハイドロコルチゾン注 デキサート注(20mg/body)	ステロイドです	60分	 																												
ダラザレックス注(16mg/kg)	抗がん剤です	4~7時間	 																												
レブラミドカプセル (25mg/body)	抗がん剤です	1日1回 内服	                                 																												
デカドロン錠(40mg/week)	ステロイドです	朝 内服	   																												

治療による副作用

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
自覚症状	アレルギー様症状		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんま疹、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせください。																												
	食欲不振・吐き気		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																												
	胃部不快感		胃の痛みやげっぷ、むかつき、腹部膨満感、食欲がないなど、気になる症状があるときはお知らせください。																												
	便秘		水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いでしょう。																												
	下痢		便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水のような便が出るときはお知らせ下さい。																												
検査値	白血球減少		感染しやすくなりますので、手洗いうがい心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																												
	赤血球減少(貧血)		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																												
	血小板減少		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																												

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。 ※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。

- 心臓・血管への影響(高血圧、胸の圧迫感、足のむくみ)
- 皮疹(皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい)

本資料は参考としてお使いください



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

国家公務員共済組合連合会
大手前病院