




【MM Kd療法(2コース目以降)について】

(カiproリス+デキサメタゾン)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール**(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			デキサート注(20mg/body)	ステロイドです	30分	📄	📄						📄	📄						📄	📄											
カiproリス注(56mg/m2)	抗がん剤です	30分	📄	📄						📄	📄						📄	📄													📄	
デカドロン錠(20mg/body)	ステロイドです	1日1回内服																							📄	📄						

😊 **治療による副作用** :注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
自覚症状	アレルギー様症状	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんま疹、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせください。																												
	不眠	寝つきが悪くなる時があります。症状があるときはお知らせください。																												
	胃部不快感	胃の痛みやゲップ、むかつき、腹部膨満感、食欲がないなど、気になる症状があるときはお知らせください。																												
	便秘	水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いのでお知らせください。																												
検査値	白血球減少	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																												
	赤血球減少(貧血)	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																												
	血小板減少	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																												

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 心臓・血管への影響(高血圧、胸の圧迫感、足のむくみ) ●皮疹(皮膚の痒みや発赤など)
- 咳・息切れ・息苦しさ

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。

本資料は参考としてお使いください
国家公務員共済組合連合会
大手前病院



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。