



【MM VPd療法について】

(ベルケイド+ポマリスト+デキサメタゾン)



様

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
ポマリストカプセル(4mg/day)	抗がん剤です	内服																						
デカドロン錠(20mg/day)	ステロイドです	内服						1回1C													この週はお休みです。			
ベルケイド注(1.3mg/m2)	抗がん剤です	皮下注射						1回5錠												胃を荒らすことがありますので胃薬も一緒に飲みます。免疫が低下しますので、手洗いうがいを心がけましょう。				

😊 治療による副作用

:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	発熱																							
	悪寒、発熱があるときはお知らせください。																							
	食欲不振・吐き気																							
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																							
	倦怠感																							
	疲れ、脱力感などを感じたときは無理をせず、体を休めてください。																							
便秘																								
水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。																								
下痢																								
便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																								
手足のしびれ																								
手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出る場合があります。																								
検査値	白血球減少																							
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																							
	赤血球減少(貧血)																							
めまい・ふらつきが出たりします。転倒に注意してください。																								
血小板減少																								
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																								

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 咳・息切れ・息苦しさ
- 心臓・血管への影響(高血圧、胸の圧迫感、足のむくみ)
- 帯状疱疹(皮膚のチクチクするような痛みから始まる発疹・水ぶくれ)
- その他の副作用・・・発疹・皮疹、貧血、不眠 など

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。

本資料は参考としてお使いください
国家公務員共済組合連合会
大手前病院



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。