



# 【リンパ腫 CHOP療法について】

(エンドキサン+ドキシソルビシン+オンコビン+プレドニゾン)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
			グラニセトン注 プレドニン注(100mg/body)	吐き気止めです	30分	📄																			
オンコビン注(1.4mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	10分	📄																						📄
ドキシソルビシン(50mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	30分	📄																						📄
エンドキサン注(750mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	60分	📄																						📄
プレドニゾン錠 (100mg/body)	ステロイドです	朝・昼 内服																							

尿が赤くなる場合があります。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

朝 10 錠、昼 10 錠

胃を荒らすことがありますので胃薬も一緒に飲みます。  
免疫が低下しますので、手洗い・うがいを心がけましょう。

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気																							
	不眠																							
	胃部不快感																							
	口内炎																							
	便秘																							
	手足のしびれ																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							

心機能低下 (治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

本資料は参考としてお使いください  
**国家公務員共済組合連合会**  
**大手前病院**