



【リンパ腫 CMD療法について】
(イリノテカン+ノバントロン+デキサメタゾン)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前 | 作用 | めやすの時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 | |
|------------------|--------|--------|------------------------------|--------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|
| | | | グラニセトン注 デキサート注(40mg/body) | 吐き気止めです ステロイドです | 30分 | ☺ | ☺ | ☺ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イリノテカン注(25mg/m2) | 抗がん剤です | 60分 | ☺ | ☺ | | | | | | | 🙄 | | | | | | | | | | | | | | ☺ |
| ノバントロン注(8mg/m2) | 抗がん剤です | 30分 | | | ☺ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

🙄 この週はお休みです。

🙄 この週はお休みです。

🗨️ 尿の色が青くなることがあります。

😊 **治療による副作用**

: 注意が必要な時期

| | | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 | |
|------|-----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|
| 自覚症状 | 食欲不振・吐き気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不眠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 胃部不快感 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 口内炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査値 | 白血球減少 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 赤血球減少(貧血) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血小板減少 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

本資料は参考としてお使いください
国家公務員共済組合連合会
大手前病院