



【リンパ腫 THP-COP療法について】 (テラルビシン+エンドキサン+オンコピン+プレドニゾン)



様



コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
グラニセトン注 プレドニン注(40mg/body)	吐き気止めです	30分																							
オンコピン注(1mg/m2)	抗がん剤です	10分																							
テラルビシン注(30mg/m2)	抗がん剤です	30分																							
エンドキサン注(500mg/m2)	抗がん剤です	60分																							
プレドニゾン錠(40mg/body)	ステロイドです	朝 内服																							

尿が赤くなることがあります。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

胃を荒らすことがありますので胃薬も一緒に飲みます。免疫が低下しますので、手洗いうがいを心がけましょう。

朝8錠

:注意が必要な時期

☺ 治療による副作用

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
食欲不振・吐き気																								
不眠																								
胃部不快感																								
口内炎																								
便秘																								
手足のしびれ																								
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																								
検査値																								
白血球減少																								
赤血球減少(貧血)																								
血小板減少																								

心機能低下 (治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

本資料は参考としてお使いください
国家公務員共済組合連合会
大手前病院