



【乳 HER療法について】  
(ハーセプチン)



様  ー 日目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
ハーセプチン(初回:8mg/kg) 以降:6mg/kg	抗がん剤です	90分(30分)																							
			2回目から投与時間が短くなる場合があります。								この週はお休みです。				この週はお休みです。										

😊 **治療による副作用**

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
自覚症状	過敏症																								
	心機能低下	痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																							
		動悸や息切れ、むくみが現れた場合はお知らせください																							

:注意が必要な時期



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

\* 実際の投与スケジュールと異なる場合があります。  
本資料は参考としてお使い下さい

国家公務員共済組合連合会  
大手前病院