



【乳 nabPTX療法について】 (アブラキサン)



様

コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
デキサート注	吐き気止めです	10分																							
アブラキサン注(260mg/m ²)	抗がん剤です	30分																							

この週はお休みです。

この週はお休みです。

☺ 治療による副作用

:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気																							
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																						
	筋肉痛・関節痛																							
		肩や背中、腰や腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなることがあります。																						
	口内炎																							
		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																						
手足のしびれ																								
	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																							
便秘																								
	水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。																							
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																								
	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																							
検査値	白血球減少																							
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																						
	赤血球減少(貧血)																							
		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																						
血小板減少																								
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																							
肝機能低下																								
	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。																							



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

* 実際の投与スケジュールと異なる場合があります
本資料は参考としてお使い下さい

国家公務員共済組合連合会
大手前病院