




# 【腸 mFOLFOX6+Cmab療法について】

(フルオロウラシル+レボホリナート+エルプラット+アービタックス)



様



コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			グラニセロン注 デキサート注 ポラミン注	吐き気止めとアレルギー様症状を抑える薬です	30分	☺														☺												
デキサート注 ポラミン注	吐き気止めとアレルギー様症状を抑える薬です	30分								☺															☺							
デカドロン錠	吐き気止めです	内服		☺	☺														☺	☺												
アービタックス注 (250mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	60分	☺							☺								☺							☺							
エルプラット注 (85mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	2時間	☺															☺														
レボホリナート注 (200mg/m <sup>2</sup> )	5-FUの効果を強める薬です		☺															☺														
フルオロウラシル注 (400mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	約5分	☺															☺														
フルオロウラシル注 (持続) (2400mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	46時間	☺	☺														☺	☺													

☺ **治療による副作用**

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
自覚症状	過敏症																														
	食欲不振・吐き気																														
	手足のしびれ																														
	口内炎																														
	色素沈着																														
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																														
検査値	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																														
	白血球減少																														
	赤血球減少(貧血)																														
	血小板減少																														



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。  
本資料は参考としてお使いください。

国家公務員共済組合連合会