



# 【腸 Cマブ療法について】 (アービタックス)



様

□ コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
デキサート注 ポララミン注	吐き気止めとアレルギー予防のお薬です	30分	☺							☺							☺							☺									☺
アービタックス注 (250mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	60分	☺							☺							☺							☺									☺
生理食塩液	観察期間	30分	☺							☺							☺							☺									☺

2回目から投与時間が短くなる場合があります。

## 😊 治療による副作用

□ : 注意が必要な時期

目覚症状	症状	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目			
目覚症状	アレルギー様症状																																
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																																

発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。

にきびのような発疹ができたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。

😊 \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。  
 \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。  
 \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。  
 本資料は参考としてお使いください。

国家公務員共済組合連合会