【腸 FOLFOXIRI＋bev療法について】

（フルオロウラシル＋レボホリナート＋エルプラット＋イリノテカン＋アバスチン）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様　　コース目

お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
イメンドカプセル	吐き気止めです	1日1回　内服	●	●	●												●	●	●												●
アロキシ注 デキサート柱 ブスコパン柱	吐き気止めです	15分	▼														▼														▼
アバスチン注(5mg/kg)	抗がん剤です	30分	▼														▼														
デカドロン錠	吐き気止めです	内服		⬠	⬠													⬠	⬠												
イリノテカン注(165mg/m2)	抗がん剤です	90分	▼														▼														▼
エルプラット注(85mg/m2)	抗がん剤です	2時間	▼														▼														▼
レボホリナート注(200mg/m2)	5-FUの効果を高める薬です	2時間	▼														▼														▼
フルオロウラシル注（持続）(3200mg/m	抗がん剤です	46時間	▼	←→													▼	←→													▼

1日目は、抗がん剤の投与開始**60～90分前**に飲んでください。

1日目は、抗がん剤の投与開始**60～90分前**に飲んでください。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
自覚症状	食欲不振・吐き気	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																												
	口内炎	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																												
	手足のしびれ	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。冷たい物に触れないようにしましょう。																												
	下痢	便の回数が多くなったり強い腹痛をともなったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																												
	色素沈着	肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																												
	脱毛（頭髪・まつ毛・眉毛など）	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																												
検査値	白血球減少	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																												
	赤血球減少(貧血)	貧血の症状（めまい・ふらつき）がでたりします。転倒に注意しましょう。																												
	血小板減少	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																												

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

●血圧上昇　●出血（鼻血など）　●タンパク尿　●胃腸穿孔（下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など）　●傷の治りが遅い

●血栓・塞栓（足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど）

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。
本資料は参考としてお使いください。

国家公務員共済組合連合会
大手前病院

＊注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。