



# 【腸 BiweeklyCPT-11+Pmab療法について】 (ベクティビックス+イリノテカン)



様

□ コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			グラニセトン注 デキサート注	吐き気止めです	30分	🧴														🧴												
ベクティビックス注(6mg/kg)	抗がん剤です	1時間	🧴														🧴															🧴
イリノテカン注(150mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	90分	🧴														🧴															🧴
デカドロン錠	吐き気止めです	朝 内服		🧊	🧊	🧊												🧊	🧊	🧊												

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
	食欲不振・吐き気																															
	下痢																															
	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)																															
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																															
検査値	白血球減少																															
	赤血球減少(貧血)																															
	血小板減少																															



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。  
本資料は参考としてお使いください。

国家公務員共済組合連合会