



# 【小細胞肺 CBDCA+VP-16療法について】

## (カルボプラチン+エトポシド)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
アプレピタントカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服																							
グラニセトン注 デキサート注	吐き気止めです	30分																							
デキサート注	吐き気止めです	30分																							
エトポシド注(80mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	90分																							
カルボプラチン注(5・GFR+25)m	抗がん剤です	60分																							



この週はお休みです。



この週はお休みです。

😊 **治療による副作用**

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
自覚症状	食欲不振・吐き気																								
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																								
	口内炎																								
	口の中が荒れて痛みが出る場合があります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																								
	便秘																								
症状が続く場合は、お薬で調節しますのでお知らせください。																									
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																								
髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。																									
検査値	白血球減少																								
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																								
	赤血球減少(貧血)																								
	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																								
	血小板減少																								
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																									
	腎機能低下																								
顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出る場合があります。																									



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。  
本資料は参考としてお使いください

国家公務員共済組合連合会  
大手前病院