



【非小細胞肺 CDDP+VNR療法について】 (シスプラチン+ロゼウス)




様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																			1日目			
			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	
イメンドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服																							
アロキン注 デキサート注	吐き気止めです	10分																							
ロゼウス注(25mg/m2)	抗がん剤です	5分																							
生理食塩液	静脈炎を防ぎます	30分																							
シスプラチン注(80mg/m2)	抗がん剤です	60分																							
デカドロン錠	吐き気止めです	朝 内服																							



腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。
無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。

😊 **治療による副作用**

			1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																			1日目			
自覚症状	食欲不振・吐き気	1回2錠																							
	血管痛・静脈炎		点滴の途中に、注射部分やその周りに違和感や痛みなどがあればお知らせください。																						
	口内炎		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																						
	便秘		症状が続く場合は、お薬で調節しますのでお知らせください。																						
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)		髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。																						
検査値	白血球減少		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																						
	赤血球減少(貧血)		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																						
	血小板減少		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																						
	腎機能低下		顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。																						



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
 * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。
 本資料は参考としてお使いください
**国家公務員共済組合連合会
 大手前病院**