



【非小細胞肺 Bev+CBDCA+PEM療法について】 (アバステン+カルボプラチン+アリムタ)



様



コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
パンビタン	葉酸を含む総合ビタミンです	1日1回 内服	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
イメドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服	☑	☑	☑																			☑
グラネセトロン注 デキサート注	吐き気止めです	30分	☑																					☑
アバステン注(15mg/kg)	抗がん剤です	90分	☑																					☑
アリムタ注(500mg/m ²)	抗がん剤です	10分	☑																					☑
カルボプラチン注(6・GFR+25)m	抗がん剤です	60分	☑																					☑
デカドロン錠	吐き気止めです	1日1回 内服		☑	☑																			☑

※ アリムタ注による副作用軽減のため、パンビタン(葉酸の粉薬)の内服、メチコパール(ビタミンB12)の注射を行います。

☺ 治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	過敏症																							
	食欲不振・吐き気																							
	皮疹																							
	口内炎																							
	手足のしびれ																							
	便秘																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							
	肝機能低下																							

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。
本資料は参考としてお使いください



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使用することもあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

国家公務員共済組合連合会
大手前病院