



## 【小細胞肺 CBDCA+CPT-11療法について】

(カルボプラチナ+イリノテカン)



様



コース目

お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
イメントカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服	○	○	○																										
グラニセトロン注 デキサート注	吐き気止めです	10分	□							□								□													
イリノテカン注(60mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	90分	□							□								□													
カルボプラチナ注(6・GFR+25)ml	抗がん剤です	60分	□																												
デカドロン錠	吐き気止めです	朝 内服		△	△	△	△				△	△	△	△					△	△	△	△									

この週は  
お休みです。

### 治療による副作用

: 注意が必要な時期

自覚症状	食欲不振・吐き気	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
	食欲不振・吐き気																													
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																												
	下痢																													
		便の回数が多くなったり強い腹痛をともなったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																												
	便秘																													
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																													
		髪質が少し変わることがあります。治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しきないでください。																												
	白血球減少																													
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																												
	赤血球減少(貧血)																													
		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																												
	血小板減少																													
		出血しやすくなったり手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																												
	腎機能低下																													
		顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。																												

\*実際の投与スケジュールと異なる場合があります。

本資料は参考としてお使いください

国家公務員共済組合連合会  
大手前病院



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したもので、必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。