



【非小細胞肺 GEM+VNR療法について】 (ゲムシタピン+ビノレルビン)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
デキサート注	吐き気止めです	10分																						
ロゼウス注(25mg/m2)	抗がん剤です	5分																						
ソルデム3	輸液です	30分																						
ゲムシタピン注(1000mg/m2)	抗がん剤です	30分																						



この週はお休みです。

😊 **治療による副作用**

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目				
自覚症状	発熱																										
		悪寒、発熱があるときはお知らせください。																									
	食欲不振・吐き気																										
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																									
	血管痛・静脈炎																										
		点滴の途中に、注射部分やその周りに違和感や痛みなどがあればお知らせください。																									
口内炎																											
	口の中が荒れて痛みが出る場合があります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																										
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																											
	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。																										
便秘																											
	水分を多めに摂りましょう。症状が続く場合は、お薬で調節します。																										
検査値	白血球減少																										
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																									
	赤血球減少(貧血)																										
		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																									
	血小板減少																										
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																										
腎機能低下																											
	顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出る場合があります。																										
肝機能低下																											
	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																										

肺の症状(治療開始から2~6ヶ月ほどで起こることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。

本資料は参考としてお使いください

国家公務員共済組合連合会
大手前病院