



【肺扁平上皮 ニボルマブ+イピリウムマブ+CBDCA+PTX】 (オブジーボ+ヤーボイ+カルボプラチン+パクリタキセル)



様

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用		めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42												
アブレピタントカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服																																																									
オブジーボ注(360mg/body)	抗がん剤です	30分																																																									
ヤーボイ注(1mg/kg)	抗がん剤です	30分																																																									
グラニセトン注 デキサート注 ファモチジン注 ポラミン注	吐き気止めです アレルギー症状 を抑える薬です	10分																																																									
パクリタキセル注(200mg/m2)	抗がん剤です	3時間																																																									
カルボプラチン注(6・GFR+25)mg	抗がん剤です	60分																																																									
デカドロ錠	ステロイドです	1日1回 内服																																																									

1回2錠

治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
自覚症状	アレルギー様症状	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんま疹、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせください。																																									
	食欲不振・吐き気	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																																									
	筋肉痛・関節痛	肩や背中、腰や腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなることがあります。																																									
	便秘	水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いのでお知らせください。																																									
	脱毛	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																																									
	手足のしびれ	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																																									
検査値	白血球減少	感染しやすくなりますので、手洗いうがいをお心がけしましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																																									
	赤血球減少(貧血)	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																																									
	血小板減少	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																																									
	腎機能低下	顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。																																									
	肝機能低下	体がだるい、食欲が出ない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。																																									

免疫関連有害事象:別紙参照

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。

本資料は参考としてお使いください



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使用することもあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

国家公務員共済組合連合会
大手前病院