



# 【胃 mFOLFOX6療法について】 (フルオロウラシル+レボホリナート+エルプラット)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用			めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
グラニセトン注	吐き気止めです	30分	💧																				💧														💧
デキサート注	吐き気止めです	内服		📄	📄																			📄	📄	📄											📄
エルプラット注 (85mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	2時間	💧																				💧														💧
レボホリナート注 (200mg/m <sup>2</sup> )	5-FUの効果を高める薬です	2時間	💧																				💧													💧	
フルオロウラシル注 (400mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	約5分	💧																				💧													💧	
フルオロウラシル注 (持続) (2400mg/1)	抗がん剤です	46時間	↔️💧↔️																				↔️💧↔️													↔️	

この週はお休みです。

この週はお休みです。

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目								
自覚症状	過敏症																																					
	食欲不振・吐き気																																					
	口内炎																																					
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																					
	手足のしびれ																																					
検査値	白血球減少																																					
	赤血球減少(貧血)																																					
	血小板減少																																					
	肝機能低下																																					



\* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。  
 \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。  
 \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。  
 \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。  
 本資料は参考としてお使いください。

国家公務員共済組合連合会  
 大手前病院