



**【胃 weekly PTX療法について】**  
**(パクリタキセル)**



様



コース目

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
ファモチジン注																															
デキサート注	副作用を抑える薬です	30分																													
ポララミン注																															
パクリタキセル注(80mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	1時間																													

デキサート注には、吐き気止めとしての作用もあります。



この週は  
お休みです。

治療による副作用

: 注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
過敏症																													
食欲不振・吐き気																													
筋肉痛・関節痛																													
口内炎																													
手足のしびれ																													
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																													
白血球減少																													
赤血球減少(貧血)																													
血小板減少																													
肝機能低下																													



\* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。

\* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したもので、必ずこの通りになるとは限りません。

\* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。

\* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。  
本資料は参考としてお使いください。

国家公務員共済組合連合会  
大手前病院