



【膝 mFOLFIRINOX療法について】 (イリノテカン+オキサリプラチン+レボホリナート+フルオロウラシル)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
アプレピタントカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服	📄	📄	📄												📄	📄	📄														📄
パロノセトロン注 デキサート注 ブスコパン注	吐き気止めと下痢防止の薬です	15分	💉														💉																💉
デカドロン錠	吐き気止めです	朝 内服		📄	📄	📄	📄											📄	📄	📄													
イリノテカン注(150mg/m2)	抗がん剤です	90分	💉															💉															💉
オキサリプラチン注(85mg/m2)	抗がん剤です		💉															💉															💉
レボホリナート注(200mg/m2)	5-FUの効果を高める薬です	2時間	💉															💉															💉
フルオロウラシル注(持続)(2400mg/m2)	抗がん剤です	46時間	↔️															↔️															↔️

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
自覚症状	過敏症	痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																											
	食欲不振・吐き気	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																											
	口内炎	口の中が荒れて痛みが出る場合があります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																											
	下痢	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水のような便が出る時はお知らせ下さい。																											
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。																											
	手足のしびれ	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。冷たい物に触れないようにしましょう。																											
検査値	白血球減少	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																											
	赤血球減少(貧血)	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																											
	血小板減少	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																											
	肝機能低下	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。																											



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
 * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

* 実際の投与スケジュールと異なる場合があります。
 本資料は参考としてお使い下さい

国家公務員共済組合連合会
 大手前病院