




# 【MDS AZA (iv) 療法について】 (ビダーザ)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
グラニセロン注	吐き気止めです	15分																														
ビダーザ注 (75mg/m2)	抗がん剤です	10分																														

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
	食欲不振・吐き気																															
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																														
	便秘																															
		水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。																														
検査値	白血球減少																															
		感染しやすくなりますので、手洗いうがい心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																														
	赤血球減少(貧血)																															
		貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																														
	血小板減少																															
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																															
	肝機能低下																															
		体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる可能性があります。																														

皮疹(皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい。)  
肺の症状(息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。  
本資料は参考としてお使いください



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

国家公務員共済組合連合会  
大手前病院