



【MM DBd療法(9コース目以降)について】
(ダラザレックス+ベルケイド+デキサメタゾン)



様

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																			1日目					
アセトアミノフェン錠 ニボラジン錠 モンテルカスト錠	副作用を抑える薬です	1日1回内服	📄	📄																							📄 📄
ハイドロコトロン注 デキサート注(20mg/body)	ステロイドです	60分	💉																								💉
ダラザレックス注(16mg/kg)	抗がん剤です	4~7時間	💉																								💉

😊 **治療による副作用**

📅 : 注意が必要な時期

		1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																			1日目						
自覚症状	アレルギー様症状																										
	発熱	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんま疹、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせください。																									
	胃部不快感	悪寒、発熱があるときはお知らせください。																									
	倦怠感	胃の痛みやむかつき、食欲がないなどの症状があればお知らせください。																									
	便秘	疲れ、脱力感などを感じたときは無理をせず、体を休めてください。																									
検査値	白血球減少	水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。																									
	赤血球減少(貧血)	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを中心に心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																									
	血小板減少	めまい・ふらつきが出たりします。転倒に注意してください。																									

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 咳・息切れ・息苦しさ
- 心臓・血管への影響(高血圧、胸の圧迫感、足のむくみ)
- 帯状疱疹(皮膚のチクチクするような痛みから始まる発疹・水ぶくれ)
- その他の副作用・・・発疹・皮疹、貧血、不眠 など

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。

本資料は参考としてお使いください
国家公務員共済組合連合会
大手前病院



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。