



【MM Vd療法 (weekly) について】

(ベルケイド+デキサメタゾン)



様

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
デカドロン錠(20mg/day)	ステロイドです	内服																						
ベルケイド注(1.3mg/m2)	抗がん剤です	数分 (皮下注射)																						

胃を荒らすことがありますので胃薬も一緒に飲みます。
免疫が低下しますので、手洗い・うがいを心がけましょう。

治療による副作用

: 注意が必要な時期

自覚症状	発熱	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
	食欲不振・吐き気																						
	倦怠感																						
	便秘																						
	下痢																						
	手足のしびれ																						
	白血球減少																						
	血小板減少																						

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかつていませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 咳・息切れ・息苦しさ
- 心臓・血管への影響(高血圧、胸の圧迫感、足のむくみ)
- 帯状疱疹(皮膚のチクチクするような痛みから始まる発疹・水ぶくれ)
その他の副作用… 発疹・皮疹、貧血、不眠など



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものですが、必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。

本資料は参考としてお使いください
国家公務員共済組合連合会
大手前病院