



【MM Vd療法について】 (ベルケイド+デキサメタゾン)



様

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			デカドロン錠 (20mg/day)	ステロイドです	1日1回 内服	☯	☯	☯	☯				☯	☯		☯	☯							
ベルケイド注(1.3mg/m ²)	抗がん剤です	皮下注射	🪡			🪡				🪡			🪡											🪡

1回5錠



この週はお休みです。

胃を荒らすことがありますので胃薬も一緒に飲みます。
免疫が低下しますので、手洗い・うがいを心がけましょう。

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	発熱																							
	食欲不振・吐き気																							
	倦怠感																							
	便秘																							
	下痢																							
	手足のしびれ																							
検査値	白血球減少																							
	血小板減少																							

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 咳・息切れ・息苦しさ
 - 心臓・血管への影響(高血圧、胸の圧迫感、足のむくみ)
 - 帯状疱疹(皮膚のチクチクするような痛みから始まる発疹・水ぶくれ)
- その他の副作用・・・ 発疹・皮疹、貧血、不眠 など



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。

本資料は参考としてお使いください
国家公務員共済組合連合会
大手前病院