



【MM VMP療法(1-4コース目)について】 (ベルケイド+アルケラン+プレドニゾン)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	1日目				
アルケラン錠(9mg/m2)	抗がん剤です	1日1回 内服	☯	☯	☯	☯																																										☯	
プレドニゾン錠(60mg/m2)	ステロイドです	朝・昼 内服	☯	☯	☯	☯																																											☯
ベルケイド注(1.3mg/m2)	抗がん剤です	皮下注射	📌			📌				📌			📌											📌				📌																				📌	

胃を荒らすことがありますので胃薬も一緒に飲みます。免疫が低下しますので、手洗いうがい心がけましょう。

😊 **治療による副作用**

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	1日目								
自覚症状	食欲不振・吐き気																																																			
	発熱																																																			
	下痢																																																			
	口内炎																																																			
	倦怠感																																																			
	手足のしびれ																																																			
検査値	白血球減少																																																			
	赤血球減少(貧血)																																																			
	血小板減少																																																			

注意が必要な時期

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 咳・息切れ・息苦しさ ●心臓・血管への影響(高血圧、胸の圧迫感、足のむくみ) ●帯状疱疹(皮膚のチクチクするような痛みから始まる発疹・水ぶくれ)

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使いください

くれ)

その他の副作用... 発疹・皮膚 貧血 不眠 など



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使用します。

国家公務員共済組合連合会
七千九百七