



【リンパ腫 RB療法について】
(リツキシマブ+トレアキシン)



様



コース目

😊 お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
アプレビントカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服	○	○	○																								○		
アロキシ注 ハイドロコートン注	副作用を抑える薬です	30分	□																									□			
トレアキシン注(90mg/m2)	抗がん剤です	90分	□	□																								□			
アセトアミノフェン錠	アレルギー様症状を抑える薬です	1日1回 内服	○		1回1錠																							○			
ニポラジン錠		1日1回 内服	○		1回1錠																							○			
リツキシマブ注(375mg/m2)	抗がん剤です	3~6時間	□																									□			

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

自覚症状	アレルギー様症状	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
食欲不振・吐き気																														
血管痛・静脈炎																														
便秘																														
白血球減少																														
赤血球減少(貧血)																														
血小板減少																														
肝機能低下																														

皮疹(皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい。)

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。

本資料は参考としてお使いください
國家公務員共済組合連合会
大手前病院



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したもので必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。