



【AML AZA+Ven 療法(2サイクル目以降)について】 (ビダーザ+ベネクレクタ)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			ベネクレクタ錠 (400mg/body)	抗がん剤です	1日1回 内服	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯
グラニセトン注	吐き気止めです	15分	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧
ビダーザ注 (75mg/m ²)	抗がん剤です	10分	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧

併用するお薬によって服用する量が変わることがあります。

😊 治療による副作用

:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
検査値	食欲不振・吐き気																															
	便秘																															
検査値	白血球減少																															
	赤血球減少(貧血)																															
	血小板減少																															
	肝機能低下																															

皮疹(皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい。)
肺の症状(息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。
本資料は参考としてお使いください



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

国家公務員共済組合連合会
大手前病院