



## 【AML AZA+Ven 療法(2サイクル目以降)について】 (ビダーザ+ベネクレクスタ)



様



コース目

**お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
ベネクレクスタ錠(400mg/body)	抗がん剤です	1日1回 内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
グラニセトロンゼリー	吐き気止めです	内服	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ビダーザ注(75mg/m2)	抗がん剤です	皮下注射	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

### 治療による副作用

: 注意が必要な時期

検査値	食欲不振・吐き気	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
検査値	便秘																													
	白血球減少																													
検査値	赤血球減少(貧血)																													
	血小板減少																													
検査値	肝機能低下																													

皮疹(皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい。)

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。

肺の症状(息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

本資料は参考としてお使いください



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したもので、必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

国家公務員共済組合連合会  
大手前病院