



【リンパ腫 Pola+RB療法(2-6サイクル目)について】 (ポライビー+リツキシマブ+トレアキシ)



様

コー

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																				
アセトアミノフェン錠	アレルギー様症状を抑える薬です	1日1回 内服		1回1錠																			
ニボラジン錠		1日1回 内服		1回1錠																			
アプレピタントカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服																					
アロキシ注 ハイドロコートン注	ステロイドです	30分										この週はお休みです。								この週はお休みです。			
トレアキシ注(90mg/m2)	抗がん剤です	90分																					
リツキシマブ注(375mg/m2)	抗がん剤です	3~6時間																					
ポライビー注(120mg/m2)	抗がん剤です	30分																					

😊 **治療による副作用**

:注意が必要な時期

		1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																					
自覚症状	アレルギー様症状																						発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。
	食欲不振・吐き気																						食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。
	血管痛・静脈炎																						点滴の途中に、注射部分やその周りに違和感や痛みなどがあればお知らせください。
	下痢																						便の回数が多くなったり、強い腹痛があったり、水のような便が出る場合はお知らせください。
	手足のしびれ																						手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。
検査値	白血球減少																						感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。
	赤血球減少(貧血)																						貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。
	血小板減少																						出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。

腎機能低下	顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。
肝機能低下	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。

皮疹(皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい。)

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

本資料は参考としてお使いください
国家公務員共済組合連合会
大手前病院

