




【リンパ腫 R2療法(1コース目)について】

(リツキシマブ+レブラミド)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール**(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用		めやすの時間		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
アセトアミノフェン錠 ニボラジン錠	副作用を抑える薬です	1日1回 内服																																			
ハイドロコトン注	ステロイドです	30分		1回1錠ずつ																																	
リツキシマブ注(375mg/m ²)	抗がん剤です	3~6時間		1回 4カプセル																																	
レブラミドカプセル (20mg/body)	抗がん剤です	1日1回 内服																																			

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目							
自覚症状	アレルギー様症状																																				
	食欲不振・吐き気																																				
	不眠																																				
	胃部不快感																																				
	便秘																																				
	下痢																																				
検査値	白血球減少																																				
	赤血球減少(貧血)																																				
	血小板減少																																				

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。
●心臓・血管への影響(高血圧、胸の圧迫感、足のむくみ) ●皮疹(皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい)

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使いください



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

国家公務員共済組合連合会
大手前病院