



【乳 Bev+wPTX療法について】
(アバスチン+パクリタキセル)



様



コース目

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
ファモチジン注	アレルギー止め	30分	点滴							点滴						点滴													点滴		
ポララミン注	吐き気止め出す																													点滴	
パクリタキセル注 (90mg/m ²)	抗がん剤です	60分	点滴							点滴						点滴													点滴		
アバスチン注(10mg/kg)	抗がん剤です	90分(30分)	点滴														点滴												点滴		

2回目から点滴時間が短くなることがあります。

治療による副作用

: 注意が必要な時期

自覚症状	過敏症	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
	過敏症																														
	食欲不振・吐き気																														
	筋肉痛・関節痛																														
	口内炎																														
	手足のしびれ																														
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																														
検査値	白血球減少																														
	赤血球減少(貧血)																														
	血小板減少																														
	肝機能低下																														

- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したもので、必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

* 実際の投与スケジュールと異なる場合があります。
 国家公務員共済組合連合会
 大手前病院