



【乳 CMF療法について】

(エンドキサン+メソトレキセート+フルオロウラシル)





様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
			エンドキサン錠(100mg/m2)	抗がん剤です	1日1回 内服	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯	☯														
グラニセトン注 デキサート注	吐き気止めです	15分	💧							💧																						💧	
デカドロン錠	吐き気止めです	内服		🏠	🏠	🏠					🏠	🏠	🏠																				
フルオロウラシル注(500mg/m2)	抗がん剤です	60分	💧							💧																							💧
メソトレキセート注(40mg/m2)	抗がん剤です	30分	💧							💧																							💧



😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目			
自覚症状	食欲不振・吐き気																																
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																																
	口内炎																																
	色素沈着																																
検査値	白血球減少																																
	赤血球減少(貧血)																																
	血小板減少																																
	肝機能低下																																



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

*** 実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい**

**国家公務員共済組合連合会
大手前病院**